

有害事象共通用語規準 ver5.0 日本語訳JCOG版

副作用	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4
悪心	摂食習慣に影響のない食欲低下	顕著な体重減少、脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の低下	カロリーや水分の経口摂取が不十分; 経管栄養/TPN/入院を要する	-
嘔吐	治療を要さない	外来での静脈内輸液を要する; 内科的治療を要する	経管栄養/TPN/入院を要する	生命を脅かす
便秘	不定期または間欠的な症状; 便軟化薬/緩下薬/食事の工夫/浣腸を不定期に使用	緩下薬または浣腸の定期的使用を要する持続的症狀; 身の回り以外の日常生活動作の制限	排便を要する頑固な便秘; 身の回りの日常生活動作の制限	生命を脅かす; 緊急の処置を要する
下痢	ベースラインと比べて<4回/日の排便回数増加; ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量が軽度増加	ベースラインと比べて4~6回/日の排便回数増加; ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量の中等度増加; 身の回り以外の日常生活動作の制限	ベースラインと比べて7回/日以上の排便回数増加; 入院を要する; ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量の高度増加; 身の回りの日常生活動作の制限	生命を脅かす; 緊急の処置を要する
味覚異常	食生活の変化を伴わない味覚変化	食生活の変化を伴う味覚変化; 不快な味; 味の消失	-	-
食欲不振	食生活の変化を伴わない食欲低下	顕著な体重減少や栄養失調を伴わない摂取量の変化; 経口栄養剤補充	顕著な体重減少や栄養失調を伴う; 静脈栄養/経管栄養/TPNを要する	生命を脅かす; 緊急の処置を要する
口腔粘膜炎	症状がないまたは軽度の症状; 治療を要さない	経口摂取に支障のない中等度の疼痛または潰瘍; 食事の変更を要する	高度の疼痛; 経口摂取に支障がある	生命を脅かす; 緊急の処置を要する
HFS	疼痛を伴わない軽微な皮膚の変化または皮膚炎	疼痛を伴う皮膚の変化(角層剥離、水疱、出血、亀裂、浮腫、角質増殖症); 身の回り以外の日常生活動作の制限	疼痛を伴う高度の皮膚の変化; 身の回りの日常生活動作の制限	-
爪囲炎	爪壁の浮腫や紅斑; 角質の剥離	局所的治療を要する; 内服治療を要する; 疼痛を伴う爪壁の浮腫や紅斑; 滲出液や爪の分離を伴う; 身の回り以外の日常生活動作の制限	外科的処置を要する; 抗菌薬の静脈内投与を要する; 身の回りの日常生活動作の制限	-
息苦しさ	中等度の労作に伴う息切れ	極めて軽度の労作に伴う息切れ; 身の回り以外の日常生活動作の制限	安静時の息切れ; 身の回りの日常生活動作の制限	生命を脅かす; 緊急の処置を要する

有害事象共通用語規準 ver5.0 日本語訳JCOG版

副作用	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4
末梢神経障害 (運動ニューロパチー) (感覚ニューロパチー)	臨床所見・検査所見のみ; 知覚異常; 治療を要しない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限	生命を脅かす; 緊急の処置を要する
めまい	症状がないまたは軽度の症状; 臨床所見または検査値所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限	生命を脅かす; 緊急の処置を要する
倦怠感	だるさがある、または元気がない	身の回り以外の日常生活動作を制限するだるさがある、または元気がない状態	身の回りの日常生活動作を制限するだるさがある、または元気がない状態	-
嚥下障害	症状があるが、通常食の摂取が可能	症状があり、摂食/嚥下に変化がある	摂食/嚥下に高度の変化がある; 経管栄養/TPN/入院を要する	生命を脅かす; 緊急の処置を要する
口腔内痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限	-